

# 定期予防接種一覧表

種別	予防接種の種類・回数 【予診票の色】	接種回数	法で定められた 接種対象年齢	標準的な 接種年齢	間隔	予診票	
個別	ロタウイルス 【白地緑枠】	ワクチンごと	経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン(1価) 出生6週0日後～24週0日後 2回接種  五価経口弱毒生ロタウイルスワクチン(5価) 出生6週0日後～32週0日後 3回接種	生後2か月～ 出生14週6日後 (初回接種)	27日以上	予防接種説明書・予診票セットに同封	
	B型肝炎 【白地ピンク枠】	3回	1歳未満	生後2か月～ 9か月	※1		
	ヒブ(Hib) 【薄緑色】	年齢ごと	生後2か月～5歳未満が対象 <接種開始年齢> 生後2か月～生後7か月未満 4回接種 生後7か月～1歳未満 3回接種 1歳～5歳未満 1回接種	初回:生後2か月～ 生後7か月  追加:3回目終了後 7か月～13か月	※2		
	小児用肺炎球菌 【水色】	年齢ごと	生後2か月～5歳未満が対象 <接種開始年齢> 生後2か月～生後7か月未満 4回接種 生後7か月～1歳未満 3回接種 1歳～2歳未満 2回接種 2歳～5歳未満 1回接種	初回:生後2か月～ 生後7か月  追加:1歳～ 1歳3か月	※3		
	四種混合 (ジフテリア 第1期 破傷風 第1期 百日咳 不活化ポリオ) 【白地上部黄帯】	第1期 初回	3回	生後3か月～7歳6か月未満	生後3か月～ 1歳		20日以上
集団	結核(BCG) 【白地青枠】	1回	1歳未満	生後5か月～ 8か月		(1対象時期に参照)	
	水痘(水ぼうそう) 【白地赤枠】	2回	1歳～3歳未満	1歳～ 1歳3か月			
個別	麻しん風しん 混合 【白茶色】	第1期	1回	1歳～2歳未満	1歳～ 1歳3か月	(1対象時期に参照)	
	日本脳炎 【藤色】	第2期	1回	5歳～7歳未満で、 小学校就学の1年前から小学校就学の前日まで			
		第1期 初回	2回	生後6か月～7歳6か月未満	3歳		6日以上
		第1期 追加	1回	生後6か月～7歳6か月未満 (第1期初回終了後、6か月以上の間隔をおく)	4歳		
	第2期	1回	9歳以上13歳未満	9歳			
二種混合 (ジフテリア 第2期 破傷風 第2期) 【若草色】	1回	11歳以上13歳未満	11歳				
子宮頸がん 【白色】	3回	小学6年生～高校1年生相当の女子	中学1年生の間	各ワクチン による			

※1 B型肝炎 27日以上の間隔で2回。さらに、第1回目接種から139日以上を経過した後に1回。

※2 ヒブ 4回接種の場合

初回(最後の1回以外)は、それぞれ27日以上あける。追加(最後の1回)は、初回終了後から7か月以上あける。

2回目及び3回目は1歳を超えた場合は行わない。(追加接種は可能)

ヒブ 3回接種の場合

初回(最後の1回以外)は、27日以上あける。追加(最後の1回)は、初回終了後から7か月以上あける。

2回目は1歳を超えた場合は行わない。(追加接種は可能)

※3 小児用肺炎球菌 4回接種の場合

初回(最後の1回以外)は、それぞれ27日以上あける。追加(最後の1回)は、初回終了後から60日間以上あけ、

1歳以降に接種。2回目及び3回目は2歳を超えた場合は行わない。また、2回目が1歳を超えた場合、

3回目は行わない。(追加接種は可能)

小児用肺炎球菌 3回接種の場合

初回(最後の1回以外)は、27日以上あける。追加(最後の1回)は、初回の2回目から60日間以上あけ、

1歳以降に接種。2回目は2歳を超えた場合は行わない。(追加接種は可能)

小児用肺炎球菌 2回接種の場合

60日間以上あける。

◆「法で定められた接種対象年齢」の範囲内で予防接種を完了しましょう。

◇「至るまで」、「未満」とは、誕生日の前日までです。

◇対象年齢外の場合や、法で定める接種回数以上に接種をする場合は任意接種となり、**全額自己負担**です。

◆ 予防接種ができる日は、各医療機関によって異なり、ほとんどの医療機関が予約制になっています。

ワクチンの用意がない場合もありますので、必ずお問合わせの上、接種日をお決めください。

# 定期予防接種対象年齢表

	2 か 月	3 か 月	6 か 月	9 か 月	1 歳	2 歳	3 歳	4 歳	5 歳	6 歳	7 歳	6 か 月	7 歳	8 歳	9 歳	10 歳	11 歳	12 歳	13 歳	14 歳	14 ~ 16 歳
ロタウイルス	↓	↓	1価: 27日以上の間隔で2回接種																		
B型肝炎	↓	↓	27日以上の間隔で2回接種																		
ヒブ(Hib)	↓	↓	初回については、それぞれ27日間以上あける		↑	第1回目接種から139日以上を経過した後		に1回接種													
小児用肺炎球菌	↓	↓	初回については、それぞれ27日間以上あける		↑	追加 初回終了後から60日間以上後		に1回接種													
四種混合 (ジフテリア 第1期 破傷風 第1期 百日咳 不活化ポリオ)	↓	↓	↓	第1期初回 20日以上の間隔で3回接種		↑	第1期追加 初回接種後から6か月以上後		に1回接種												
B C G			↓																		
水痘 (水ぼうそう)				↓	初回終了後、6~12か月あける																
麻しん風しん 混合				↓	第1期1回接種				↓	第2期1回接種		〔 小学校就学 1年前の年度 〕									
日本脳炎				↓	第1期初回		↓	6日以上の間隔で2回接種				↓	第2期1回接種								
二種混合 (ジフテリア 第2期 破傷風 第2期)														↓	ジフテリア・破傷風 第2期 として、二種混合を1回接種						
子宮頸がん																		↓	↓	↓	

※ ↓ 接種    □ 接種が定められている年齢    ■ 通常、接種が行われている年齢

◇ 上の表は、法律で定められた予防接種の接種期間と接種時期の目安です。

□ の期間中はいつ接種を受けてもよいですが、

各予防接種の目的から標準の接種対象年齢 ■ を目安として示してあります。

◇ 任意予防接種の助成について

「おたふくかぜ」は、市において一部助成をしております。

その他の任意予防接種については直接医療機関におたずねください。

◇ ロタウイルスについては、ワクチンの種類(ロタリックス、ロタテック)によって接種回数が異なります。

◇ 子宮頸がんについては、ワクチンの種類(サーバリックス、ガーダシル)によって接種間隔が異なります。

**上記の定期予防接種以外を接種する場合、スケジュールや、  
その他ご不明な点があれば、かかりつけ医にご相談の上、接種しましょう。**